# REGIÓN PACÍFICA


Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca.







#### **INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR POR DEPARTAMENTOS**



## **HOGARES CON EXPERIENCIA**



**Nacional** 





......



## ¡OJO!

**PRÁCTICAS DE CONSUMO** 

En la Región Pacífica 76,4%de los niños y niñas escolares consumen usualmente 3,5 veces a la semana gaseosas, té y refrescos (en polvo, caja, botella. No light)

## **DE AUTOCONSUMO**



Región



16,2 %

### LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

36,1% 45,9%

	RETRASO En talla
 	Primera

infancia	10.0
1	4

Primera infancia (0 a 4 años)	10,8%	9,9%
Escolares (5 a 12 años)	<b>7,4</b> %	6,5% *
Adolescentes (13 a 17 años)	9,7%	11,3%**

<b>^</b>	ANEMIA	4	•
	Primera infancia (0 a 4 años)	24,7%	26,6%
	Escolares (5 a 12 años)	8,0%	13,3%

	Ε
T	D

EXCESO DE PESO	*	•	
Primera infancia (0 a 4 años)	6,4%	<b>5,6</b> %	
Escolares (5 a 12 años)	24,4%	26,7%	
Adolescentes (13 a 17 años)	17,9 %	18,9%	
Jóvenes y adultos (18 a 64 años)	<b>56,5</b> %	<b>59,5</b> %	

#### **INDICADORES**

		TIEMPO EXCESIVO FRENTE A PANTALLAS	
-		Primera infancia (0 a 4 años)	
		Fscolares	

	·	·
Primera infancia (0 a 4 años)	61,9%	60,0%
Escolares (5 a 12 años)	<b>67,6</b> %	71,1%
Adolescentes (13 a 17 años)	<b>76,6</b> %	<b>75,6</b> %
Jóvenes y adultos (18 a 64 años)	56,9%	56,0%



**JUEGO ACTIVO** 

**Escolares** 

(5 a 12 años)



35,4%



**CUMPLIR CON RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA** 

**Adolescentes** 



(13 a 17 años) Jóvenes y adultos (18 a 64 años)

- \* Coeficiente de variación igual o mayor a 15% y menor a 20%, la precisión es aceptable.
- \*\* Coeficiente de variación igual o mayor a 20% y menor a 30% la precisión es regular y por lo tanto la estimación debe ser usada con precaución.

Infografía realizada en convenio con:





01 8000 91 80 80

